

NL

**Belangrijke
veiligheidsherinneringen
voor patiënten die Ferriprox
(deferipron) gebruiken**

Voorschrijvend arts:

Telefoonnummer:

**VOOR VROUWEN IN DE
VRUCHTBARE LEEFTIJD**

Gebruik Ferriprox niet als u zwanger bent of als u probeert zwanger te worden. Als Ferriprox tijdens de zwangerschap gebruikt wordt, kan het ongeboren kind ernstige schade oplopen.

U moet effectieve anticonceptie gebruiken terwijl u Ferriprox gebruikt. Vraag uw arts welke methode het geschiktst is voor u. Als u zwanger wordt terwijl u Ferriprox gebruikt, dient u het gebruik onmiddellijk te staken en uw arts in te lichten. U mag Ferriprox niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

CONTROLE VAN HET AANTAL WITTE BLOEDCELLEN ALS U FERRIPROX GEBRUIKT

Er is een kleine kans dat u agranulocytose ontwikkelt (erg laag aantal witte bloedcellen) terwijl u Ferriprox gebruikt. Dit kan tot een ernstige infectie leiden. Hoewel agranulocytose slechts bij 1 tot 2 op de 100 gebruikers optreedt, is het belangrijk dat uw bloed regelmatig gecontroleerd wordt.

Zorg dat u het volgende doet:

1. Laat uw bloed wekelijks controleren tijdens uw eerste behandeljaar met Ferriprox. Daarna zal uw arts u adviseren over de frequentie ervan.
2. Als u verschijnselen van een infectie ontwikkelt, zoals koorts, keelpijn of griepachtige verschijnselen, roep dan onmiddellijk medische hulp in. Het aantal witte bloedcellen moet binnen 24 uur gecontroleerd worden om te kijken of u mogelijk agranulocytose heeft.